

Zolfo Trivalentato Scorrevole 93%S

ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 93% S Registrazione Ministero della Sanità n. 6842 del 11/11/1986

COMPOSIZIONE

100 gr. di prodotto contengono:
zolfo puro (esente da selenio): gr. 93
inerti (solfato di calcio): q.b. a gr. 100

Stabilimento di produzione:
ZOLFI VENTILATI MANNINO S.P.A.
Contrada Corsa – 92012 Cianciana (AG)



ATTENZIONE

SOLFOCHIMICA SRL

Sede Legale: Via della Libertà n.60 – Realmonte (AG)

Sede Amm.: Via Stesicoro n.50/A – Ragusa

Tel. 0932 876364 – Fax 0932 989383

Partita n.

CONTENUTO KG 5-10-25

INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea -

CONSIGLI DI PRUDENZA:

PREVENZIONE: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P262** – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. **P270** – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P280** – Indossare guanti/indumenti protettivi.

REAZIONE: P302 + P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE: P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Kg. 25 – 35 per ettaro.

Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

APPLICAZIONE – Contro l'oidio della vite.

EPOCA DI APPLICAZIONE:

Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ:

È compatibile con la maggioranza degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.

Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali e con Captano.

AVVERTENZA:

Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:

Evitare i trattamenti nelle ore calde.

Può arrecare danno alle cultivar di VITE Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO